



Кожный антисептик «Медилис®-АСЕПТ»

Краткое описание:

Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости.

Форма выпуска:

флакон 50мл / флакон 250мл / флакон 1л

Состав:

пропанол-2 (70,0%), алкилдиметилбензиламмоний хлорид (0,05%), полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (0,1%)

Активность:


Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая возбудителей туберкулеза - тестировано на *Mycobacterium tuberculosis*), грибов (возбудителей кандидозов и дерматофитий) и вирусов (возбудителей парентеральных гепатитов В, С, D, ВИЧ-инфекции, гриппа, в т.ч. типа А H5N1, A H1N1, герпеса, цитомегалии).

Назначение:

гигиеническая обработка рук медицинского персонала при проведении оперативных вмешательств в медицинских организациях
 обработка операционного и инъекционного поля, в том числе обработка локтевых сгибов доноров
 обеззараживание перчаток перед утилизацией
 обеззараживание поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, а также труднодоступных для обработки и требующих быстрого обеззараживания и высыхания поверхностей
 обеззараживание приборов, медицинского оборудования (в том числе поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа, стоматологического оборудования, оптических приборов, разрешенных производителем к обработке)
 обеззараживание оборудования и поверхностей в машинах скорой медицинской помощи и санитарном транспорте
 обеззараживание датчиков УЗИ, стетоскопов и фонендоскопов, стоматологических наконечников
 обработка обуви для профилактики грибковых заболеваний
 применение населением в быту

Срок хранения:

Срок годности - 5 лет в заводской упаковке производителя.



*Вся продукция зарегистрирована и сертифицирована для продажи в Европе

Европейский стандарт обработки рук EN-1500

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ РУК «МЕДИЛИС-АСЕПТ»

1. Тереть одну ладонь о другую ладонь возвратно-поступательными движениями, ладонь к ладони, включая запястья



2. Правой ладонью растирать тыльную поверхность левой кисти, поменять руки



3. Соединить пальцы одной руки в межпальцевых промежутках другой, тереть внутренние поверхности пальцев движениями вверх и вниз



4. Соединить пальцы в «замок», тыльной стороной согнутых пальцев растирать ладонь другой руки



5. Охватить основание большого пальца левой кисти между большим и указательным пальцами правой кисти, врачающее трение.



6. Круговым движением тереть ладонь левой кисти кончиками пальцев правой руки, поменять руки

